

# Africanized Honey Bees Stats and Facts – Spanish



## HECHOS

1. Las muertes relacionadas con los insectos están asociadas a tres tipos de trabajos: agricultura, construcción y jardinería.
2. Alrededor del 80% de los que mueren por picaduras de abeja, avispa o avispon son hombres.
3. Si una abeja pica a alguien, otras personas deben permanecer junto a la víctima para asegurarse de que no se produce una reacción alérgica. Hay que lavar el lugar de la picadura con agua y jabón y retirar el aguijón, pero hay que utilizar una uña o una gasa, en lugar de apretar o utilizar pinzas
4. Los consejos del sitio de los CDC para que los trabajadores eviten las picaduras incluyen el uso de ropa de color claro y no usar productos con aroma a plátano.
5. Las cifras de muertes pueden estar subestimadas debido a diagnósticos erróneos como ataques cardíacos o insolaciones o pueden atribuirse a otras causas.
6. La mayoría de las personas sólo experimentan una pequeña hinchazón y dolor después de ser picados, pero muchos individuos pueden experimentar otros síntomas después de una picadura. Las picaduras de insectos pueden provocar cualquiera de los siguientes síntomas
  - Dolor
  - Enrojecimiento
  - Hinchazón
  - Enrojecimiento
  - Urticaria
  - Anafilaxia.

## ESTADÍSTICAS

- Las abejas Africanizadas suelen ser mucho más defensivas que otras variedades de abejas y reaccionan a las perturbaciones más rápidamente que las abejas europeas. Pueden perseguir a una persona hasta 400 metros; han matado a unos 1.000 seres humanos, cuyas víctimas reciben 10 veces más picaduras que las abejas melíferas europeas.
- Son sin duda las abejas más agresivas del mundo y son responsables de al menos 1.000 muertes sólo en Estados Unidos.
- En un año normal, las picaduras de abeja causan casi 100 muertes en Estados Unidos. De hecho, esta cifra probablemente representa una subestimación, ya que algunas muertes por picadura de abeja se atribuyen erróneamente a ataques cardíacos, insolaciones y otras causas.
- Estudios recientes informan de 1.109 muertes por picaduras de abejas, avispones

y avispa. Y si ha tenido una reacción alérgica grave a una picadura de abeja, hay un 30-60% de posibilidades de que experimente una anafilaxia completa la próxima vez que le piquen.