


Give Jacks, Lifts, And Hoists The High Safety Priority They Deserve Stats and Facts – Spanish



HECHOS

1. Los peligros asociados al uso de equipos de elevación en la construcción u otras operaciones marítimas son:
 - Los trabajadores pueden ser aplastados por objetos en movimiento cuando los vehículos o el equipo no están bien sujetos.
 - Los polipastos pueden volcar y caer cuando las bases de fijación no están bien sujetas, o debido a vientos fuertes o cargas desequilibradas.
 - El personal puede caerse de las plataformas elevadoras o ser golpeado cuando éstas se mueven.
 - Los trabajadores pueden sufrir daños musculoesqueléticos relacionados con esfuerzos de fuerza, posturas ergonómicas inadecuadas y/o riesgos de trabajo repetitivo.

ESTADÍSTICAS

GATAS HIDRÁULICAS

- personas en EE.UU. reciben tratamiento hospitalario de urgencia en un solo año por lesiones causadas por el colapso de gatos.
- El 82% de los heridos en colapsos de gatos tenían entre 15 y 45 años. Sólo el 2% eran menores de 15 años.
- El 39% de las lesiones más graves se produjeron en la mano, el dedo o la muñeca. Otro 17% de las heridas más graves se produjeron en la parte superior del tronco, y otro 15% en la cabeza, el cuello o la cara.

ELEVADORES

- Según B.L.S. y la CPSC, los incidentes con ascensores causan la muerte de unas 30 personas y heridas graves a unas 17.000 cada año. Los ascensores causan casi el 90% de las muertes y el 60% de las lesiones graves.
- Las lesiones de las personas que trabajan en ascensores o cerca de ellos - incluidos los que instalan, reparan y mantienen ascensores, y los que trabajan en los huecos de los ascensores o cerca de ellos- representan 14 (casi la mitad) de las muertes anuales.

POLIPASTOS

De 2011 a 2017, el Censo de Lesiones Ocupacionales Fatales (CF0I) informó 297 muertes totales relacionadas con polipastos, un promedio de 42 por año durante este período de 7 años. Los hombres representaron 293 de las 297 lesiones mortales relacionadas con polipastos. Los trabajadores blancos no hispanos representaron el 72 % de las lesiones mortales relacionadas con polipastos, mientras que el 15 % implicó a trabajadores hispanos y latinos.