

Home Healthcare Hazards and Solutions

Stats and Facts – Spanish



HECHOS

Riesgo nº 1: Entorno de atención al paciente – Los resbalones, tropiezos y caídas son la segunda causa más común de lesiones en un entorno de atención sanitaria a domicilio. Esto incluye lesiones al cliente o a usted, por lo que deben tomarse las máximas precauciones para evitarlas.

Riesgo nº 2: Control de infecciones – Como trabajador sanitario a domicilio, usted es responsable del uso y la eliminación seguros de todo el material punzocortante que utilice en el domicilio del paciente.

Riesgo nº 3: Manipulación de pacientes – Una de las principales causas de lesiones en pacientes y empleados es la manipulación física de los pacientes.

Riesgo nº 4: Mascotas y animales – Las mordeduras y arañazos de animales son un riesgo exclusivo de los trabajadores sanitarios a domicilio. Las mordeduras pueden causar lesiones importantes y requerir cuidados quirúrgicos. Los arañazos, los tropiezos con animales domésticos y las reacciones alérgicas son otros riesgos asociados. A menos que conozca bien al animal, evite cualquier contacto con mascotas.

Riesgo nº 5: Documentación – La documentación completa y precisa es importante para todos los trabajadores sanitarios a domicilio. En un entorno de asistencia sanitaria a domicilio pueden darse circunstancias excepcionalmente difíciles, y es importante no dejar nunca que las emociones negativas o defensivas impulsen su documentación.

ESTADÍSTICAS

- En 2018, a nivel nacional, se reportaron 49,040 lesiones y enfermedades entre los auxiliares de atención médica domiciliaria (BLS, 2018a). Entre los casos de lesiones y enfermedades, el 43% tenía 45 años o más (BLS, 2018c).
- El tipo de lesión más frecuente entre los auxiliares de atención médica domiciliaria fueron las distensiones, los esguinces y los desgarros, con una tasa de incidencia de 205,6 lesiones por cada 10.000 trabajadores a tiempo completo (ETC) y una prevalencia del 36% (BLS, 2018g). El dolor y las agujetas también fueron un tipo de lesión frecuente, representando el 26% de los casos notificados y con una tasa de incidencia de 111,0 lesiones por cada 10.000 ETC (BLS, 2018g). Los hematomas y contusiones se notificaron con una tasa de 32,3 lesiones por cada 10 000 ETC (BLS, 2018g). En 2018, el 46% de las lesiones y enfermedades reportadas requirieron 5 días o menos fuera del trabajo, mientras que el 26% requirió más de 30 días de pérdida de tiempo (BLS, 2018b).

- Las lesiones de los trabajadores sanitarios representaron el 73 % de todas las lesiones y enfermedades no mortales en el lugar de trabajo debidas a la violencia en 2018.
- en 2018 la tasa de incidencia de lesiones intencionadas para casos no mortales que implicaron días de baja laboral en la asistencia sanitaria y social fue del 13,9 % 10.000 trabajadores a tiempo completo (1.050 casos) en la administración local, y del 89,3 (4.850 casos) en la administración estatal. La tasa de incidencia de todos los trabajadores para casos que involucran días fuera del trabajo para el gobierno local fue de 163,9 y para el gobierno estatal fue de 142,6.
- En 2018, los homicidios en el lugar de trabajo en la industria privada de atención médica y asistencia social representaron el 4 por ciento del total de homicidios en el lugar de trabajo. Para el total de casos fatales, los homicidios a trabajadores de la salud representaron menos del 1 % de las 5,250 muertes en el lugar de trabajo en 2018.
- Hubo 156 homicidios en el lugar de trabajo a trabajadores de la sanidad privada, con una media de unos 20 cada año. El agresor más común en los homicidios en el lugar de trabajo de trabajadores de la salud fue un familiar o pareja doméstica del trabajador lesionado.