

Opioid Abuse Stats & Facts – Spanish



HECHOS

1. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona tiene más probabilidades de morir por una sobredosis accidental de opioides que por un accidente de tráfico.
2. La prescripción adecuada de opioides es esencial para proteger la salud y la seguridad de los beneficiarios de Medicare. Uno de cada tres beneficiarios de la Parte D de Medicare recibió un opiáceo recetado en 2016.
3. Sólo la mitad de los empleadores están muy seguros de que tienen las políticas y los recursos de RRHH adecuados para hacer frente al uso y abuso de opioides en el lugar de trabajo.
4. Los empleadores están más preocupados por la contratación de trabajadores cualificados, y por los beneficios de los empleados y los costes de compensación de los trabajadores, que por el uso de opioides de prescripción legal por parte de los empleados o el uso/venta ilícita de opioides.
5. El uso indebido de opiáceos con receta entre los estudiantes de último año de secundaria se encuentra en su índice más bajo desde que la encuesta comenzó a evaluarlo.

ESTADÍSTICAS

- Estados Unidos está inmerso en una epidemia de sobredosis de opioides. Los opioides (incluidos los opioides recetados, la heroína y el fentanilo) mataron a más de 47.600 personas en 2017, más que cualquier otro año registrado. El 37% de todas las muertes por sobredosis de opioides implican un opiáceo recetado.
- 95% – En 2017, el 95% de las 70.067 muertes por sobredosis en Estados Unidos se produjeron entre la población en edad laboral, personas de entre 15 y 64 años. Se desconoce cuántos estaban empleados en el momento de su muerte.
- 3,8% – Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud, se estima que el 3,8% de los encuestados de 18 años o más informaron del uso de opioides ilícitos en el último año. Se estima que el 63,0% de estos consumidores de opiáceos ilícitos autodeclarados estaban empleados a tiempo completo o parcial.
- 25% – La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que las muertes por sobredosis en el trabajo por uso no médico de drogas o alcohol aumentaron al menos un 25% anualmente entre 2013 y 2017. Las 272 muertes por sobredosis en el lugar de trabajo reportadas en 2017 representaron el 5,3% de las muertes por lesiones laborales ese año, en comparación con el 1,8% en 2013. Se desconoce cuántas de estas muertes fueron causadas por opioides específicamente.
- En un análisis del NIOSH de los datos del BLS para los años 2011 a 2016, el 43% de las muertes por sobredosis de drogas en el trabajo se produjeron en solo tres industrias: Transporte y Almacenamiento, Construcción y Asistencia Sanitaria y Social.
- 14,8 días – Los trabajadores con un trastorno por consumo de sustancias actual

pierden una media de 14,8 días al año, mientras que el subconjunto con un trastorno por consumo de analgésicos pierde una media de 29 días al año. Esto contrasta con una media de 10,5 días para la mayoría de los empleados, y una media de 9,5 días para los trabajadores que se están recuperando de un trastorno por consumo de sustancias.

- Las visitas a los servicios de urgencias por sobredosis de opioides aumentaron un 30% en todas las partes de Estados Unidos desde julio de 2016 hasta septiembre de 2017.
- Más de 760.000 personas han muerto desde 1999 por sobredosis de drogas. Dos de cada tres muertes por sobredosis de drogas en 2018 involucraron un opiode.