Violence Prevention in Healthcare Stats and Facts – Spanish

HECHOS

1. Los sectores de la asistencia sanitaria y los servicios sociales experimentan los mayores índices de lesiones causadas por la violencia laboral y tienen 5 veces más probabilidades de sufrir una lesión por violencia laboral que los trabajadores en general.
2. Las muertes violentas en el lugar de trabajo entre los trabajadores de la salud (HCW) siguen siendo poco estudiadas en la literatura existente a pesar de las graves implicaciones a largo plazo que pueden tener para la seguridad del personal y de los pacientes.
3. Los empleadores deben comprender la definición de violencia en el trabajo de la OSHA y aplicar políticas que protejan a los empleados de la "amenaza de violencia física, acoso, intimidación u otro comportamiento perturbador amenazante que se produzca en el lugar de trabajo".
4. En circunstancias en las que los empleados estén en riesgo de sufrir una agresión física, los empleadores deben implementar mecanismos que puedan alertar rápidamente al personal de seguridad y a los servicios de emergencia sobre un acto de violencia.
5. La tercera causa de muerte de los trabajadores de los servicios sanitarios y profesionales se debe a la violencia laboral.
6. Los empleados con potencial para cometer actos de violencia en el lugar de trabajo tienden a mostrar comportamientos como actuar fuera de lo normal o mostrar hábitos adictivos.

ESTADÍSTICAS

- La violencia en el lugar de trabajo debida a lesiones intencionadas por otra persona en el sector de la asistencia sanitaria y social privada representó el 2% del total de 900.380 casos de lesiones o enfermedades profesionales no mortales que requirieron días de ausencia del trabajo en 2018.
- Mientras que el 75% de las casi 25.000 agresiones en el lugar de trabajo se producen anualmente en entornos sanitarios, solo el 30% de las enfermeras y el 26% de los médicos de urgencias han denunciado incidentes de violencia1.
- Los trabajadores sanitarios representaron el 73% de todas las lesiones y enfermedades laborales no mortales debidas a la violencia en 2018.
- El 80% del personal de los Servicios de Emergencia Médica ha sido agredido por pacientes.
- El homicidio es la segunda causa principal de muerte en el lugar de trabajo para los trabajadores de la salud en el hogar.

- El 78% de los médicos de los Servicios de Urgencias y el 100% de las enfermeras de los Servicios de Urgencias han sufrido violencia por parte de los pacientes en el último año.
- La incidencia anual de agresiones físicas en un entorno psiquiátrico es del 70%.
- Entre las residencias de ancianos con unidades de demencia, el 59% de los auxiliares de enfermería declararon ser agredidos por los pacientes semanalmente y el 16% diariamente.
- El 46% de las enfermeras declararon haber sufrido algún tipo de violencia en el lugar de trabajo durante sus cinco turnos más recientes.